

sp.zn. sukls133454/2013

**Příbalová informace** - Informace pro uživatele

## **Aciclovir AL krém**

Aciklovirum

### **Držitel rozhodnutí o registraci:**

ALIUD PHARMA GmbH  
Gottlieb-Daimler-Straße 19  
D-89150 Laichingen  
Německo

### **Výrobce:**

STADA Arzneimittel AG  
Stadastr. 2-18  
61118 Bad Vilbel  
Německo

### **Složení**

*Léčivá látka:*

Aciclovirum (aciclovir) 50mg v 1g krému.

*Pomocné látky:*

Dimetikon, glyceromakrogol-stearát, cetylalkohol, tekutý parafin, propylenglykol, bílá vazelína, čištěná voda.

### **Indikační skupina**

Dermatologikum, virostatikum.

### **Charakteristika**

Aciclovir AL krém je účinný v léčbě infekcí vyvolaných virem Herpes simplex. Aciklovir přítomný v krému Aciclovir AL krém se mění na účinnou látku s protivirovým účinkem teprve po průniku do buňky infikované virem. Uvedené viry se tedy sami podílejí na vzniku látky, která výrazně brání jejich množení.

### **Indikace**

Aciclovir AL krém se používá k tlumení bolesti a svědění u kožních infekcí vyvolaných herpetickými viry. Užívá se k léčbě jak u první, tak u opakované infekce, především u oparu na rtu (Herpes simplex).

Aciclovir AL krém mohou používat dospělí, mladiství i děti.

### **Kontraindikace**

Aciclovir AL krém nesmíte užívat při přecitlivělosti na aciklovir nebo některou z pomocných látek. Protože působí dráždivě na sliznicích, nesmí se používat v ústech a pochvě a zejména ne na oční spojivky.

Pouze na doporučení lékaře mohou přípravek používat nemocní s poruchou imunitního systému.

**Těhotenství a kojení:**

Přesto, že při pokusech na zvířatech nebyl pozorován žádný znetvořující účinek, měl by se krém v těhotenství používat pouze při pečlivém zvážení poměru přínosu oproti možným rizikům.

V době kojení je třeba se vyhnout použití krému v oblasti prsů.

**Nežádoucí účinky**

Aciclovir AL krém může vyvolat přechodné pálení ošetřených oblastí kůže. Na ošetřených místech a někdy i v těsném okolí se občas objevuje zarudnutí, vysychání a šupinky.

Pokud se vyskytnou tyto nežádoucí účinky nebo jiné neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem.

**Interakce**

Dosud nejsou známy. Přesto bez porady s lékařem nenanášejte na stejná místa jiné přípravky k zevnímu použití.

**Dávkování a způsob použití**

Pokud lékař nedoporučí jinak, krém se obvykle nanáší v tenké vrstvě na infikované oblasti kůže pětkrát denně ve čtyřhodinových intervalech během dne. Nanáší se bavlněným tamponem. Pokud se nanáší rukou je třeba ruce před i po použití krému důkladně umýt, aby se zabránilo infekci poškozené kůže např. bakteriemi nebo přenosu viru na nová dosud neinfikovaná místa kůže či sliznic. Aciclovir AL krém je třeba nanést i na oblasti přiléhající k místům s viditelnými známkami herpetické infekce (puchýřky, otok, zarudnutí). Léčba obvykle trvá pět dní. Pokud však příznaky do pěti dnů neustoupí, poraďte se o dalším užívání krému s lékařem. Doba léčení nemá být delší než deset dní.

**Upozornění**

K dosažení co nejlepšího výsledku by mělo být léčení Aciclovir AL krém zahájeno co nejdříve, jakmile pocítíte první známky infekce, pálení, svědění, zarudnutí. Protivirová léčba Aciclovir AL krém je neúčinná poté, co se na postižených místech začnou tvořit strupy.

Při použití krému na přirození nebo v okolí konečníku může vazelína obsažená v Aciclovir AL krém snižovat odolnost současně použitého latexového kondomu proti roztržení a snižovat tím jeho spolehlivost.

Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

**Uchovávání**

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Po prvním otevření se lék nesmí užívat déle než 12 měsíců.

**Varování**

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí.

**Balení**

Hliníková tuba se šroubovacím uzávěrem, krabička

Velikost balení: tuba s 2g krému,  
tuba s 5g krému.

**Datum poslední revize**

8.8.2013