

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Bepanthen

mast

(Dexpanthenolum)

Držitel rozhodnutí o registraci:

Bayer s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce

GP Grenzach Produktions GmbH

Emil-Barell Strasse 7

79639 Grenzach-Wyhlen

Německo

Složení:

léčivá látka - dexpanthenolum 50 mg

pomocné látky - mast'ový základ, cetylalkohol, stearylalkohol, bílý vosk, tuk z ovčí vlny, bílá vazelína, panenský mandlový olej, tekutý parafin, čištěná voda

Indikační skupina

Dermatologikum

Charakteristika

Léčivá látka dexpanthenol se v buňkách kůže přeměňuje na vitamin kyselinu pantothenovou. Ta je nepostradatelná pro tvorbu a regeneraci kůže. V Bepanthen masti je dexpanthenol zpracován do mast'ového základu s vysokým obsahem tuku.

Terapeutické indikace

Bepanthen mast lze použít při každém podráždění kůže, projevujícím se jejím zarudnutím, zduřením, svěděním nebo pálením, ke kterému může dojít po nadměrném slunění (i po užití umělých světelných zdrojů, např. solárií). Dále k ošetření menších popálenin, otlaků, podrážděné pokožky po nesprávném použití kosmetických přípravků, vlivem drsného počasí nebo jinak podrážděné, ale neporušené kůže. Přípravek je vhodný i k denní péči o suché, rozpraskané nebo drsné ruce. K ošetření větších ploch je vhodnější lotion. K ošetření drobných poranění, odřenin nebo škrábanců je vhodnější použít Plus krém, který obsahuje navíc dezinfekční prostředek a snižuje nebezpečí infekce rány.

Přípravek lze používat i v těhotenství a během kojení k denní péči o pokožku kojence a k ošetření bradavek kojících žen. Pouze na doporučení lékaře se mast používá k ošetření děložního čípku.

Kontraindikace

Přípravek se nesmí používat při alergii na dexpanthenol nebo tuk z ovčí vlny, ev. na jiné složky přípravku.

Nežádoucí účinky

Přípravek je většinou velmi dobře snášen. Velice zřídka se mohou vyskytnout alergické reakce (zduření a zarudnutí kůže s následným výsevem svědicích až pálících pupínků a puchýřků, mokváním a tvorbou strupů). Při výskytu těchto nebo jiných neobvyklých reakcí se poraďte se svým lékařem.

Interakce

Nejsou známy interakce s jinými léky.

Dávkování a způsob použití

Mast se nanáší v tenké vrstvě na vodou očištěnou podrážděnou nebo zanícenou kůži podle potřeby jednou až několikrát denně až do úplného zhojení.

Při suché pokožce nanášet podle potřeby i několikrát denně (3x) na postižená místa.

Při kojení: po každém kojení nanést mast na kousek sterilní gázy a potřít bradavku.

Při péči o kojence: při každém přebalení nanést mast na předtím vodou dobře očištěnou pokožku zadečku a přirození.

Upozornění

Bez porady s lékařem můžete přípravek používat na nemocnou kůži u dětí nejdéle 7 dní. Jestliže při používání přípravku obtíže neustoupí do 7 dní nebo se naopak zhoršují, poraďte se s lékařem. Na nepodrážděnou pokožku dětí se může mast používat bez omezení!

Při předpisu jiných léků oznamte lékaři, že používáte Bepanthen mast.

Při požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Uchovávání

Uchovávat při teplotě do 25°C.

Varování

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu!

Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení

Tuba 30 g, 3,5 g, 100 g

Datum poslední revize

23.9.2009