

## Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace č.j. 1992/05

**Příbalová informace - VP**  
**Informace pro použití, čtěte pozorně !**

### **Rennie** Žvýkací tablety

**Držitel regisračního rozhodnutí:**  
Bayer s.r.o., Praha, Česká republika

**Výrobce:**  
Bayer Santé Familiale  
33, rue de l'Industrie  
74240 Gaillard  
Francie

#### **Složení**

Léčivé látky: Calcii carbonas 680 mg, Magnesii subcarbonas ponderosus 80 mg

Pomocné látky: sacharosa 475 mg, bramborový škrob, kukuřičný škrob, mastek, lehký tekutý parafín, mátové a citrónové aroma, magnesium-stearát

#### **Indikační skupina**

Antacidum

#### **Charakteristika**

Rennie žvýkací tablety jsou léčivým přípravkem, který chrání sliznici žaludku a tenkého střeva tím, že působí proti překyselení žaludeční šťávy. Žvýkací tablety neutralizují přebytečné žaludeční kyseliny a obnovují normální rovnováhu ve složení žaludeční šťávy. Tak jsou žaludeční a střevní sliznice chráněny proti škodlivým vlivům. Jelikož jsou žvýkací tablety dobře rozpustné, nastupují účinky přípravku rychle.

#### **Indikace**

Překyselení žaludku a tím vyvolané žaludeční obtíže (pálení žáhy, pocit plnosti, nadýmání, pocit na zvracení – nausea, plynatost).

Rennie žvýkací tablety mohou být použity v doporučených dávkách i při žaludečních obtížích vyvolaných překyselením v průběhu těhotenství. Přípravek mohou použít i kojící matky.

#### **Kontraindikace**

Při omezené činnosti ledvin a u dětí do 15-ti let věku se má Rennie žvýkací tablety užívat pouze na doporučení lékaře.

Léčivý přípravek se nesmí používat při přecitlivělosti na některou účinnou nebo

pomocnou látku, při zvýšené hladině vápníku a hořčíku v krvi a moči, při těžkém poškození ledvin a při střevní neprůchodnosti.

### **Nežádoucí účinky**

Při léčebných dávkách se nežádoucí účinky prakticky nevyskytují. Při předávkování se může u některých pacientů vyskytnout zácpa nebo průjem. Při několikaměsíčním užívání vysokých dávek uhličitanu vápenatého může dojít ke zvýšení kalcia v krvi, v moči, k alkalizaci moče, event. může dojít až k selhání ledvin.

Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraděte se svým lékařem

### **Interakce**

Vstřebávání a vylučování jiných, současně užívaných léků může být ovlivněno a týká se to zvláště těch, které se vstřebávají pouze v kyselém prostředí. Proto se nedoporučuje současné užívání Rennie žvýkacích tablet s jinými léky.(např. tetracykliny, salicyláty, vit. D). Má se dodržovat odstup asi 2 hodin mezi podáním tohoto přípravku a jiného léku. V nejasných případech je nutná porada s lékařem.

### **Upozornění**

Při omezené funkci ledvin a u dětí mladších 15-ti let se poraděte s lékařem. Pozor při diabetu! V jedné žvýkací tabletě je cca 0,5 g sacharózy. Při pokračování obtíží, nebo když se za léčby nedostaví očekávaný účinek, je nutná co nejdříve porada s lékařem. Antacida se doporučuje užívat pro příležitostnou léčbu a všeobecně ne déle než 2 týdny nepřetržitě, pokud lékař neurčí jinak.

### **Dávkování**

Dospělí a děti starší 15-ti let 1 – 2 žvýkací tablety mezi dvěma jídly nebo kdykoliv při obtížích rozpustit v ústech (cucat). Neužívejte více než 16 tablet za 24 hodin..

### **Varování**

Přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Na blistru je doba použitelnosti označena EXP. a číslo šarže C.S.

Ukládejte mimo dosah a dohled dětí.

### **Uchovávání:**

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

### **Balení**

6, 24, 48, 96 žvýkacích tablet

### **Datum poslední revize**

20.4. 2005