

sp.zn.sukls82920/2013

Příbalová informace - VP
Informace pro použití, čtěte pozorně!

OROFAR

pastilky, orální sprej, orální roztok

Držitel rozhodnutí o registraci:

NOVARTIS s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:

Pastilky:

Kemwell AB, Uppsala, Švédsko

Orální roztok:

Novartis s.r.o., Ohradní 61, 140 00 Praha 4, Česká republika

Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika

Orální sprej:

Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika

Složení:

Pastilky

Léčivé látky: 1 mg benzoxonii chloridum a 1 mg lidocaini hydrochloridum monohydricum v 1 pastilce.

Pomocné látky: sorbitol, mikrokrystalická celuloza, makrogol 6000, kukuřičný škrob, dihydrát sodné soli sacharinu, chlorid sodný, pomerančové aroma, magnesium-stearát, kyselina citronová.

Orální sprej

Léčivé látky: benzoxonii chloridum 2 mg/ml a lidocaini hydrochloridum monohydricum 1,5 mg/ml.

Pomocné látky: ethanol 96% v/v, glycerol, roztok kyseliny chlorovodíkové 0,1 mol/l, silice máty peprné, menthol, čištěná voda.

Orální roztok

Léčivé látky: benzoxonii chloridum 0,5 mg/ml a lidocaini hydrochloridum monohydricum 0,5 mg/ml.

Pomocné látky: ethanol 96% v/v, glycerol, roztok hydroxidu sodného 300g/l, monohydrát kyseliny citronové, silice máty peprné, menthol, čištěná voda.

Indikační skupina:

Otorinolaryngologikum.

Charakteristika:

Co je to Orofar?

Orofar obsahuje látku působící proti infekci a látku působící znecitlivění (anestetikum).

Je používán pro léčbu zánětů ústní dutiny a hltanu. Orofar je dostupný ve formě pastilek, spreje a roztoku pro vyplachování nebo kloktání.

Jak působí Orofar?

Orofar působí proti bakteriím, virům a houbám, které způsobují bolesti v krku a infekce ústní dutiny. Jeho složka lidokain (lokální anestetikum) zmírňuje bolesti v krku a bolesti při polykání způsobené zánětem. Orofar nedráždí ústní dutinu a hrdlo.

Indikace:

Kdy je vhodné Orofar užívat?

Orofar se užívá k léčbě infekcí v dutině ústní a hrdle při nachlazení, při zánětu hltanu, hrtanu, k léčbě aftů a zánětu dásní.

Orofar může být také užíván na doporučení lékaře jako pomocná léčba při angíně.

Orofar roztok je doporučován k odstranění zubního plaku.

Přípravek je vhodný pro dospělé a děti starší než 4 roky.

Kontraindikace:

Kdy byste neměli užívat Orofar?

Orofar byste neměli používat pokud jste přecitlivělí na sloučeniny obsahující kvartérní amonium, lidokain a nebo některou ze složek přípravku.

Děti: užívání Orofaru se nedoporučuje u dětí mladších 4 let.

Těhotenství a kojení

Podobně jako před užíváním jiných léků se i před užitím Orofaru v těhotenství nebo v období kojení nejprve poraďte se svým lékařem.

Nežádoucí účinky:

Jaké nežádoucí účinky může Orofar mít?

V některých případech se může vyskytnout lehké místní podráždění které je přechodné.

Ve velmi vzácných případech může dojít k alergické reakci jako jsou vyrážky a nebo otok úst/hltanu. V takovém případě přerušete léčbu a okamžitě se poraďte se svým lékařem.

Také informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud zpozorujete jiné nežádoucí účinky, u kterých předpokládáte, že mohou být vyvolané lékem Orofar.

Interakce:

Interakce nejsou dosud známy.

Dávkování a způsob užití:

Jak užívat Orofar?

Pastilky

Každé 2-3 hodiny nechte pomalu rozpustit 1 pastilku v ústech. Dávkování je možné zvýšit na 1 pastilku každou hodinu či dvě. Nepřekročte dávku 10 pastilek denně.

Pastilky se nemají žvýkat ani polykat.

Afty: pastilku nechte pomalu rozpustit tak, aby byla v kontaktu s afty.

Orální sprej

Vstříknete Orofar sprej do ústní dutiny nebo do hltanu 3-6krát denně. Sprej držte kolmo a při každé aplikaci 4krát silně stlačte.

Návod k použití:

- Odstraňte ochranné víčko
- Pevným přitlačením připevněte ústní aplikátor na horní část nádoby s pumpičkou.
- Před prvním použitím stříknete několikrát do vzduchu (dokud se sprej neobjeví ve vzduchu), aby se naplnila pumpička.
- Ústní aplikátor je třeba po použití desinfikovat pomocí čistého kapesníku zvlhčeného malým množstvím přípravku a poté osušit. Zejména je nutné aplikátor desinfikovat a osušit, pokud by měl být použit jinou osobou.
- Po použití spreje Orofar je třeba aplikátor sejmout a uložit jej ve skládačce až do dalšího použití.

Orofar sprej je určen pouze k aplikaci na sliznici dutiny ústní (do úst a krku). Pokud dojde k poškození aplikátoru, nelze jej používat.

Orální roztok (ústní voda / kloktadlo)

Ráno a večer po jídle kloktejte nebo vyplachujte ústa 30-60 vteřin jednou polévkovou lžící neředěného roztoku. Roztok nepolykejte. Při dlouhodobější léčbě, např. při bolestech v krku, může být roztok v průběhu dne užít i častěji nebo může být během dne nahrazen pastilkami či sprejem. Orální roztok doporučujeme používat zejména při denní péči o ústní dutinu, při léčbě zubního plaku, zánětu dásní a při paradontóze (chronickém onemocnění dásní).

Děti :

Orofar mohou používat i děti od čtyř let, ale dávkování musí být sníženo. Denně se nemá překročit dávka šest pastilek, sprej vstříknete jen 2-3krát při každé aplikaci. Čajová lžička roztoku dostačuje pro vypláchnutí ústní dutiny.

Pokud máte pocit, že účinek léku je velmi slabý nebo naopak velmi silný, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

Předávkování:

Co dělat, pokud jste užili příliš velké množství Orofaru?

V případě náhodného požití velkého množství přípravku okamžitě kontaktujte vašeho lékaře nebo lékárníka.

Zvláštní upozornění:

Na co je třeba pamatovat, když užíváte Orofar?

Pokud jsou bolesti v krku doprovázeny vysokými horečkami nebo pokud přetrvávají déle než 5 dní, poradte se se svým lékařem.

Pokud užíváte Orofar roztok déle než 2 týdny, může se objevit hnědé zbarvení jazyka a nebo zubů. Zbarvení zmizí po přerušení léčby.

Pastilky jsou slazené sacharinem a sorbitolem, nepodporují vznik zubního kazu.

Rada pro diabetiky: deset pastilek Orofar se rovná jednomu kusu ovoce.

Orofar by se neměl užívat bezprostředně před jídlem, aby se předešlo špatnému spolknutí potravy v důsledku znecitlivujícího působení lidokainu.

Lék uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud máte lék, u kterého uplynula doba použitelnosti, vraťte ho, prosím, lékárníkovi. Více informací Vám ochotně poskytne lékař nebo lékárník, kteří mají k dispozici podrobnou informaci určenou zdravotnickým pracovníkům.

Varování:

Tento lék nepoužívejte po uplynutí data použitelnosti vyznačeného na obalu „Použitelné do:“.

Balení:

Pastilky: 8, 16, 24 pastilek

Orální sprej: 30 ml

Orální roztok: 200 ml

Kde je Orofar k dostání?

V lékárně, výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

Uchovávání:

Pastilky

Uchovávejte při teplotě do 30° C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Orální sprej, orální roztok

Uchovávejte při teplotě do 30° C.

Datum poslední revize:

10.5.2013