

Příbalová informace - pro volně prodejný přípravek  
Informace pro použití, čtěte pozorně

## F U N G I C I D I N L É Č I V A

(Nystatinum)

mast

Držitel rozhodnutí o registraci/Výrobce

Zentiva, k.s., Praha, Česká republika

Složení

Léčivá látka: Nystatinum 100 000 m.j. v 1 g masti

Pomocné látky: Bílá vazelína, tuk z ovčí vlny (lanolin), bílý vosk, tekutý parafin, cetylalkohol

Indikační skupina

Antimykotické antibiotikum

Charakteristika

Léčivá látka nystatin tlumí a zastavuje růst kvasinek a některých dalších nižších hub. Z povrchu kůže a sliznice se nevstřebává.

Indikace

Fungicidin Léčiva mast mohou používat dospělí, mladiství i děti od novorozeneckého věku k léčbě kvasinkových onemocnění kůže a sliznic.

Přípravek mohou používat těhotné a kojící ženy.

Kontraindikace

Fungicidin Léčiva mast se nesmí používat při známé přecitlivělosti na nystatin nebo jinou složku přípravku, zejména na lanolin. V prvních třech měsících těhotenství se nedoporučuje vnášet Fungicidin Léčiva mast do pochvy.

Nežádoucí účinky

Fungicidin Léčiva mast je obvykle dobře snášen, během léčby však může dojít k podráždění kůže, které se projeví jako zarudnutí nebo pálení v místě nanesení masti. Také může dojít k reakci z přecitlivělosti, která se může projevit zduřením a zčervenáním kůže, pálením nebo svěděním, někdy i výsevy drobných pupínků nebo puchýřků s mokváním. Při výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí přerušete léčbu a poradte se s lékařem o dalším používání masti.

Interakce

Při léčbě Fungicidinem Léčiva se nedoporučuje současné používání mastí s klotrimazolem, protože klotrimazol snižuje účinek nystatinu.

Bez porady s lékařem nepoužívejte současně s Fungicidinem Léčiva žádné volně prodejné přípravky pro místní léčbu Vašeho onemocnění. Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že používáte Fungicidin Léčiva mast.

### Dávkování a způsob použití

Pokud lékař nedoporučí jinak, nanáší se Fungicidin Léčiva mast dospělým, mladistvým i dětem ve velmi tenké vrstvě 2krát až 3krát denně na postižená místa (kůže, sliznice, do pochvy) až do vyhojení. V léčbě je třeba pokračovat i po zhojení ještě několik dní nanášením masti jen 1krát denně.

### Upozornění

Jestliže nedojde k ústupu Vašich obtíží do 10 dnů nebo naopak dojde ke zhoršení či se projeví nežádoucí účinky léku, přerušte léčbu a poradte se s lékařem. Délka léčby bez porady s lékařem by neměla přesáhnout 2 týdny.

Při náhodném požití přípravku dítětem může dojít k nevolnosti a zvracení. Je vhodné zvracení vyvolat nebo podpořit a vyhledat lékaře.

### Uchovávání

Uchovávat v suchu, při teplotě 10 – 25°C.

### Varování

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Přípravek musí být uchováván mimo dosah dětí.

### Balení

10 g masti

Datum poslední revize

19.6.2009