

sp.zn.sukls150969/2012
a sp.zn.sukls23840/2013
Příbalová informace

Informace pro použití, čtěte pozorně!

OPHTHALMO-SEPTONEX
oční kapky, roztok

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI:

Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p. 305, 747 70 Opava-Komárov, Česká republika

VÝROBCE

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company
Táncsics Mihály út. 82.
Gödöllő, H-2100
Maďarsko

SLOŽENÍ:

Léčivé látky

Carbethopendecinií bromidum 2 mg, acidum boricum 190 mg, natrii tetraboras decahydricus 5 mg
v 10 ml.

Pomocné látky

Guajazulen, sílice plodu fenyklu obecného pravého, dihydrát dinatrium-edetátu, ethanol 96% (V/V),
voda na injekci.

INDIKAČNÍ SKUPINA:

Oftalmologikum

CHARAKTERISTIKA:

Přípravek má antiseptický účinek (proti choroboplodným mikroorganismům); je určen ke vkapávání
do oka při léčení nehnisavých zánětů - tj. není-li nutná léčba antibiotiky.

INDIKACE:

Bez porady s lékařem se přípravek používá k léčbě akutních a chronických nehnisavých zánětů
spojivek, očních víček a nehnisavých povrchových zánětů rohovky.

Při závažnějších zánětech, zejména hnisavých, je nutno vyhledat lékaře.

Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti.

KONTRAINDIKACE:

Ophthalmo-Septonex nesmí být používán při známé přecitlivělosti na některou složku přípravku a při
suchém zánětu rohovky a spojivky.

TĚHOTENSTVÍ A KOJENÍ:

U těhotných a kojících žen rozhodne o užívání přípravku lékař.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY:

Přípravek je obvykle dobře snášen, ale u citlivých jedinců se mohou vyskytnout projevy překrvení a
pálení spojivky.

Při případném výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o možnosti
dalšího používání přípravku poradte s lékařem.

INTERAKCE:

Interakce nejsou dosud známy.

DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB POUŽITÍ:

Pokud lékař neurčí jinak, vkapává se do dolního spojivkového vaku při prudkých zánětech 1 kapka každou hodinu až dvě hodiny, při vleklých zánětech 1 kapka 1-3krát denně.

Přípravek může být používán maximálně 10 dní.

Postup při vkapávání: palcem jedné ruky stáhněte dolní víčko dolů, hlavu mírně zakloňte a dívejte se nahoru a druhou rukou vkápněte do oka 1 kapku.

ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A OBSLUHA STROJŮ:

Přípravek Ophthalmo-Septonex neovlivňuje činnosti (řízení motorových vozidel, obsluha strojů a práce ve výškách), které vyžadují zvýšenou pozornost, avšak po aplikaci může přechodně dojít k rozmazanému vidění, a proto činnosti vyžadující zvýšenou pozornost je možno vykonávat až po odeznění tohoto přechodného účinku.

UPOZORNĚNÍ:

Užíváte-li jiné léky, nebo máte-li nějaké závažnější oční onemocnění, poraďte se o vhodnosti užívání přípravku s lékařem.

Jestliže se do pěti dnů příznaky onemocnění nezlepší, nebo se dokonce zhorší, či se projeví nežádoucí účinky přípravku, vyhledejte okamžitě lékaře.

Při předpisu jiných léků oznamte lékaři, že používáte Ophthalmo-Septonex.

Při náhodném požití přípravku dítětem ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

UCHOVÁVÁNÍ:

Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před chladem a mrazem.

VAROVÁNÍ:

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Po prvním otevření lahvičky může být přípravek používán po dobu 4 týdnů.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

BALENÍ:

10 ml

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

DATUM REVIZE TEXTU:

2.5.2013