

Příbalová informace - VP

Informace pro použití, čtěte pozorně

Přečtěte si prosím pozorně tuto příbalovou informaci před tím, než začnete užívat tento přípravek. Příbalovou informaci si ponechte pro případ, že byste si ji chtěli znovu přečíst.

STREPSILS CITRON BEZ CUKRU

pastilky

Držitel rozhodnutí o registraci:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., Slough, Velká Británie

Výrobce

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., Nottingham, Velká Británie

Co obsahuje přípravek STREPSILS CITRON BEZ CUKRU ?

Jedna pastilka obsahuje dvě léčivé látky:

0,6 mg amylmetakresolu a 1,2 mg dichlorbenzenmethanolu.

Přípravek dále obsahuje tyto pomocné látky:

Kyselina vinná, dihydrát sodné soli sacharinu, citronové aroma, chinolinová žluť, isomalt, roztok maltitolu.

Přípravek je dostupný v těchto **velikostech balení**: 6, 8, 10,12, 16 nebo 24 pastilek v jednom balení.

Jak přípravek STREPSILS CITRON BEZ CUKRU působí?

Léčivé látky obsažené v přípravku mají antiseptické účinky a ničí bakterie způsobující bolesti v krku a záněty v ústní dutině.

Kdy se přípravek užívá ?

Přípravek se užívá ke zmírnění nebo místnímu zaléčení zánětů dutiny ústní a nosohltanu, při zánětech sliznice dutiny ústní (stomatitis, soor, afty), při zánětech dásní (gingivitis) a jako podpůrná léčba u anginy.

Kdy byste neměli přípravek užívat ?

Přípravek neužívejte, pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na amylmetakresol, dichlorbenzenmethanol nebo na kteroukoli další složku přípravku.

Přípravek není určen dětem do 5 let, velikost pastilky není vhodná pro malé děti.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, neměla byste přípravek užívat. Než začnete užívat jakýkoli léčivý přípravek, poraďte se se svým lékařem.

Nedoporučuje se užívat pastilky během jídla.

Může se užívat přípravek zároveň s dalšími léky ?

Při současném užívání s dalšími místními antiseptiky nebo antibiotiky může dojít k prohloubení antimikrobiálního účinku. Další interakce (tj. ovlivnění účinků současně užívaných léků) nejsou známy.

Jak se přípravek užívá ?

Přípravek je určen dospělým a dětem starším 5 let.

Dospělí a děti od 15 let: každé 2-3 hodiny nechte volně rozpustit v ústech 1 pastilku.

Užívejte maximálně 6 pastilek během jednoho dne.

Děti od 8 do 15 let : Užívá se 4x denně 1 pastilka

Děti od 5 do 7 let : Užívá se 3x denně 1 pastilka

Co je třeba udělat v případě předávkování ?

Při předávkování, které je vzhledem k charakteru přípravku velmi nepravděpodobné, nebo při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jaké nežádoucí účinky se mohou objevit v průběhu léčby ?

Přípravek je obvykle dobře snášen, v ojedinělých případech se mohou vyskytnout bolestivé projevy na jazyku.

Ve výjimečných případech se objevuje přecitlivělost, která se může projevovat jako kožní vyrážka, pocit pálení v ústech, horečka, průjem.

Při případném výskytu jakýchkoliv nežádoucích reakcí se poraďte s lékařem.

Upozornění :

Přetrvávají-li příznaky onemocnění déle než 5 dní u dospělých nebo déle než 3 dny u dětí nebo vyskytne-li se horečka, je nutné vyhledat lékaře.

Přípravek je určen ke krátkodobé léčbě, léčba by neměla trvat déle než 2-3 týdny.

Jedna pastilka obsahuje přibližně 1,8 g isomaltu a 0,46 g roztoku maltitolu. Proto, jestliže Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Při vyšších dávkách může mít přípravek mírný projímavý účinek. Energetická hodnota maltitolu (nebo isomaltu) je 9,66 kJ/g (2,3 kcal/g).

Jak se přípravek uchovává ?

Uchovávejte přípravek při teplotě do 25 °C.

Neužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Datum poslední revize textu

10.2.2010