

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

NEO-ANGIN BEZ CUKRU

Pastilky

(Dichlorbenzenmethanolum, amylmetacresolum, mentholum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité informace.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Neo-angin bez cukru musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo nezlepší do 5 dnů (u dětí do 3 dnů), musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek Neo-angin bez cukru a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Neo-angin bez cukru používat
3. Jak se přípravek Neo-angin bez cukru používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Neo-angin bez cukru uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK NEO-ANGIN BEZ CUKRU A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Neo-angin bez cukru má antiseptické účinky, zasahují široké spektrum známých bakterií, které vyvolávají záněty horních cest dýchacích.

Desinfikuje ústní a krční dutinu a hltan. Užívá se při bolestech v krku, kataru, nachlazení, chrapotu, zánětech sliznice v ústní dutině (stomatitis, soor, afty), dásní (gingivitis), zánětu hltanu (faryngitis) a jako podpůrná léčba u anginy.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK NEO-ANGIN BEZ CUKRU POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Neo-angin bez cukru:

- Jestliže máte astma a chronický zánět hltanu atrofického typu (s úbytkem sliznice apod.).
 - Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na anýz (badyán) nebo na kteroukoli složku přípravku.
- Přípravek je nevhodný pro děti do 6 let.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Přípravek je možné užívat současně s antibiotiky a uklidňujícími léky.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

Užívání se nedoporučuje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Neo-angin bez cukru

Pro diabetiky

1 pastilka Neo-anginu bez cukru je oslazená roztokem maltitolu 2579 mg, odpovídá 25 kJ (5,9 kcal).

Pomocná látka ponceau 4R může způsobit alergickou reakci včetně záchvatu průduškového astmatu.

Alergická reakce je častější u pacientů se známou přecitlivělostí na kyselinu acetylsalicylovou.

Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některého z cukrů, není pro Vás užívání tohoto přípravku vhodné

3. JAK SE PŘÍPRAVEK NEO-ANGIN BEZ CUKRU POUŽÍVÁ

Pokud není předepsáno jinak, dospělí a děti od 15 let nechat rozpustit každé 2-3 hodiny 1 pastilku v ústech, maximálně 6 pastilek denně. Děti od 6-7 let ráno, v poledne a večer 1 pastilku a děti od 8-15 let 4krát denně 1 pastilku s odstupem alespoň 4 hodin. Přetrvávají-li příznaky onemocnění u dospělých déle než 5 dní (3 dny u dětí), doporučujeme navštívit lékaře. I při další léčbě lékařem lze v doporučených dávkách Neo-angin bez cukru užívat jako podpůrný lék po dobu 2-3 týdnů.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Neo-angin bez cukru než jste měl(a).

Při předávkování vyhledejte ihned lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Neo-angin bez cukru

Jestliže jste zapomněl(a) užít Neo-angin bez cukru, nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte dále v užívání tak jak je předepsáno.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Neo-angin bez cukru nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Mohou se vyskytnout příležitostně alergické reakce dýchacích cest, žaludku a střev, projevující se horečkou, třesavkou a průjmem. Při výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí přestaňte lék užívat a poradte se s lékařem. Při předávkování vyhledejte ihned lékaře.

5. JAK PŘÍPRAVEK NEO-ANGIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Neo-angin bez cukru obsahuje:

Léčivými látkami jsou dichlorbenzenmethanol 1,2 mg, amylmetacresol 0,6 mg, menthol 5,72 mg v 1 pastilce.

Pomocnými látkami jsou badyánová silice, silice máty peprné, roztok maltitolu, kyselina vinná, ponceau 4R 80%.

Jak přípravek Neo-angin bez cukru vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Neo-angin bez cukru obsahuje ploché, červené, kulaté pastilky.

Velikost balení: 6, 12, 16, 18, 24 nebo 48 pastilek

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Divapharma GmbH, D-12274 Berlin, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

11.6. 2008