

Příbalová informace: informace pro uživatele

NEO-ANGIN TŘEŠEŇ

Pastilky

Dichlorbenzenmethanolum , Amylmetacresolum , Levomentholum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Neo-angin třešeň musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu

-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 4-5 dnů, musíte se poradit s lékařem.

-Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi..

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je Neo-angin třešeň a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Neo-angin třešeň užívat.
3. Jak se Neo-angin třešeň užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Neo-angin třešeň uchovávat
6. Další informace

1.CO JE NEO-ANGIN TŘEŠEŇ A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Neo-angin třešeň je vyráběn ve formě červených plochých, mírně průsvitných, kulatých pastilek. Jedna pastilka obsahuje dichlorbenzenmethanolum 1,2 mg, amylmetacresolum 0,6 mg, levomentholum 5,9 mg. Neo-angin třešeň má antiseptické účinky, zasahují široké spektrum známých bakterií, které vyvolávají záněty horních cest dýchacích.

Indikační skupina

Otorinolaryngologikum

Neo-angin pastilky bez cukru třešeň se užívá k:

prevenci a k léčbě zánětlivých a infekčních onemocnění ústní a krční dutiny a hltanu. Užívá se při bolestech v krku, nachlazení, chrapotu, zánětech sliznice v ústní dutině (stomatitis, soor,afty), dásní (gingivitis), zánětu hltanu (faryngitis) a jako podpůrná léčba u angíny.

Při potížích s polykáním, je vždy třeba navštívit lékaře, kvůli možné angíně.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE NEO-ANGIN TŘEŠEŇ UŽÍVAT

Neužívejte Neo-angin třešeň

Jestliže jste alergický(á) (hypersenzitivní) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku Neo-angin třešeň.

Jestliže vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí specifických typů cukrů.

Zvláštní opatření při použití přípravku Neo-angin třešeň je zapotřebí

Přípravek není vhodný pro děti do 6 let.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky není známo.

Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku Neo-angin třeseň s jídlem a pitím

Neo-angin třeseň může být užíván nezávisle na jídle.

Těhotenství a kojení

Užívání se nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku

Jestliže vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých typů cukrů, poraďte se se svým lékařem, dříve než začnete tento lék užívat.

Přípravek Neo-angin třeseň obsahuje také 2,58 g isomaltu (to odpovídá 25 kJ v jedné pastilce). To by mělo být bráno v potaz u pacientů s diabetes mellitus.

Neo-angin třeseň obsahuje barvivo ponceau 4R, které může vyvolat alergickou reakci.

3. JAK SE NEO-ANGIN TŘEŠEŇ UŽÍVÁ

Vždy užívejte Neo-angin třeseň podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Jestliže si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud není jinak předepsáno, nechají si dospělí a děti od 6 let pomalu rozpustit v ústech každé 2-3 hodiny 1 pastilku. Denně je možné užít maximálně 6 pastilek.

Délka léčby

Přípravek je určen ke krátkodobé léčbě akutních onemocnění.

Poraďte se se svým lékařem, jestliže se příznaky zhorší a nebo nedejde k jejich zlepšení do 4-5 dnů.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Neo-angin třeseň než jste měl(a)

Při předávkování vyhledejte ihned lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Neo-angin třeseň

Jestliže jste zapomněl(a) užít Neo-angin třeseň, nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte dále v užívání tak jak je předepsáno.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Příležitostné alergické reakce dýchacích cest, žaludku a střev se projevují horečkou, třesavkou a průjmem. isomalt obsažený v tomto léku může mít mírně projímavý účinek.

Při výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí přestaňte lék užívat a poraďte se s lékařem.

5. JAK PŘÍPRAVEK NEO-ANGIN TŘEŠEŇ UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Léčivými látkami jsou Dichlorbenzenmethanolum (1,2 mg v 1 pastilce), Amylmetacresolum (0,6 mg v jedné pastilce), Levomentholum (5,9 mg v jedné pastilce).

Pomocnými látkami jsou isomalt, kyselina vinná, třešňové aroma, silice máty peprné, ponceau 4R, indigokarmín..

Jak přípravek vypadá a co obsahuje toto balení

Balení

24 a 48 červených plochých, mírně průsvitných, kulatých pastilek.

Obal

Průhledný PVC/PVDC/A1 blistr, krabička.

Držitel rozhodnutí o registraci / Výrobce

Divapharma GmbH, D-12274 Berlin, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

4LIFE PHARMA CZ, s.r.o.

Ve Studeném 8a

147 00 Praha 4

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

19.10.2011