

Příbalová informace - VP

Informace pro použití, čtěte pozorně!

ARNIDOL spray

Držitel registračního rozhodnutí

Harras Pharma Curarina Arzneimittel GmbH

81373 München, SRN

Výrobce

Gehrlicher Pharmazeutische Extrakte GmbH + Co.KG Eurasburg, SRN

Složení

1 ml roztoku obsahuje:

Účinné látky: Hydroxyethylis salicylas 30 mg

Arnicae tinctura 100 mg

Pomocné látky: isopropylmyristát, citronelová silice, kosodřevinová silice, levandulová silice, borovicová silice, blahovičnicková silice, kafr, alkohol.

Indikační skupina

Protizánětlivý a protibolestivý přípravek ve formě spreje .

Charakteristika

ARNIDOL spray je přípravek pro zmírnění pocitu únavy svalů a kloubů a pro urychlení regenerace pohybového ústrojí. Po nastříkání na kůži prostupuje velmi dobře do hloubky, omezuje bolestivost, vznik otoků a tlumí místní zánětlivou reakci. Nástup jeho účinku je rychlý a je podporován alkoholem s přísadou kafru a vonných silic, čímž zároveň působí příjemně chladivě.

Indikace

Přípravek se používá při svalové únavě, zhmoždění, podvrtnutí a následných otocích, při stavech po nadměrné námaze nebo přetížení svalů a kloubů, vzniklém v souvislosti se sportovní nebo pracovní zátěží. Použití přípravku bez předchozího vyšetření lékařem smíte jen tehdy, není-li poraněna kůže, nejsou-li přítomny krevní výrony, nezvětšuje-li se otok a není-li výrazně omezena hybnost.

Nezlepší-li se stav do 2 až 3 dnů, je nutno poradit se s lékařem v každém případě.

Kontraindikace

ARNIDOL spray nesmějí používat osoby se zjištěnou přecitlivělostí na některou z jeho složek, zejména na salicyláty, kyselinu salicylovou nebo arniku. Přípravek nepoužívají těhotné a kojící ženy a děti do 15 let. U osob trpících nedostatečností ledvin nesmí se přípravek používat na velké plochy kůže.

Nežádoucí účinky

Přípravek je dobře snášen, ale velmi vzácně může vzniknout zarudnutí kůže, vyrážka nebo puchýře.

Interakce

Salicyláty mohou při místním používání zvýšit propustnost kůže pro jiné současně užívané přípravky. Jestliže takové přípravky používáte nebo hodláte používat, poraďte se s lékařem dříve, než použijete ARNIDOL spray.

Dávkování a způsob užití

ARNIDOL spray nastříkejte 2 až 3 krátkými stisky rozprašovače na kůži postiženého místa těla a postřík po 10 až 15 minutách opakujte nebo na místo přiložte přípravkem postříkaný mulový obvaz. Toto ošetření je možno opakovat až 3krát denně. Při postříku držte láhvičku s přípravkem svise.

Bez porady s lékařem nepoužívejte déle než 14 dní.

Upozornění

Protože přípravek obsahuje alkohol, nesmí se dostat do očí, na sliznice a do otevřených ran!

Uchovávání

ARNIDOL spray uchovávejte při teplotě do 25 °C mimo dosah dětí.

Varování

Hořlavina! Nestříkejte a prázdné lahvičky neodhazujte do otevřeného ohně!

Po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu přípravek nepoužívejte!

Velikost balení

Lahvička s obsahem 50 ml nebo 100 ml s mechanickým rozprašovačem.

Datum poslední revize textu

11.2.2009

Logo Harras Pharma Curarina Arzneimittel GmbH

HARRAS D-81373 Munchen, SRN

PHARMA